

PROVES AL·LÈRGIQUES CUTÀNIES

PRICK TEST

El prick test són unes proves cutànies que es realitzen per a diagnosticar al·lèrgies.

És un examen indolor, com a molt pot notar picor o sensació d'inflor localitzada que desapareix en uns minuts.

Per a aquesta prova **no és necessari preparacions especials, ni** estar en dejú.

La prova s'ha de realitzar a la cara interna del braç, procuri portar roba còmoda i no es posi cap tipus de crema sobre la pell.

La infermera abans de començar, li explicarà en què consisteix i li resoldrà dubtes.

No pot prendre els medicaments per a l'al·lèrgia, anomenats antihistamínics, durant els 20 dies abans de la prova (consultar amb el metge que li ha demanat el *Prick Test*).

En la part interna de l'avantbraç s'apliquen unes gotes de diferents substàncies (els al·lèrgògens), a continuació amb una llanceta, es realitza una petita punció superficial en la pell a través de cada una de les gotes.

En pocs minuts pot aparèixer picor, envermelliment i alguna pàpula.

No s'ha de gratar, doncs podria modificar el resultat de la prova.

Després d'uns 15 minuts, aproximadament, si s'han produït pàpules es revisen i es mesuren.

En acabar podrà marxar amb el resultat.

PRUEBAS ALÉRGICAS CUTÁNEAS

PRICK TEST

El prick test son unas pruebas cutáneas que se realizan para diagnosticar alergias.

Es un examen indoloro, como mucho puede notar picor o sensación de hinchazón localizada que desaparece en unos minutos.

Para realizar esta prueba **no es necesario preparaciones especiales, ni** estar en ayunas.

La prueba se realiza en la parte interna del brazo, procure llevar ropa cómoda y no se aplique ningún tipo de crema sobre la piel.

La enfermera antes de empezar, le explicará en qué consiste y le resolverá las dudas.

No puede tomar los medicamentos para la alergia, llamados antihistamínicos durante los 20 días anteriores a la prueba (consultar con el médico que le ha pedido el *Prick Test*).

En la parte interna del antebrazo se aplican unas gotas de diferentes sustancias (los alergogenos), a continuación con una lanceta, se realiza una pequeña punción superficial en la piel a través de cada una de las gotas.

En pocos minutos puede aparecer picor, enrojecimiento y algún habón.

No debe rascarse, ya que podría modificar el resultado de la prueba.

Pasados unos 15 minutos, aproximadamente, si se ha producido algún habón se revisaran y se medirán.

Al terminar podrá marchar con el resultado.




En general, és convenient consultar amb els professionals sempre que hi hagi algun dubte.

Prick Test




Proves al·lèrgiques cutànies



fundació
sant hospital
la seu d'urgell

Passeig Joan Brudieu, 8—25700 La Seu d'Urgell—

973 35 00 50—hospital@fsh.cat



fundació
sant hospital
la seu d'urgell

Edició 1
13 de juliol de 2010.